



毒品偽裝全真破解



當您感覺到

- 1.頭暈、噁心或嘔吐
- 2.視力模糊或影像扭曲
- 3.全身癱軟或無力
- 4.無法控制的過度活動
- 5.莫名焦慮
- 6.妄想、幻覺

處理方式

- ★把握時間，快速離開現場
- ★向可靠的人求助
- ★報警

線索1

彩色充氣氣球

破解

千萬別小看這些氣球布置物，裡面可能裝有“笑氣”(N₂O)產生幻覺、失憶或暈眩感覺，請儘速離開現場。



夜店是年輕人經常出入的場所，但也容易暗藏危機；提供重要的毒品偽裝可疑線索與破解方法。

線索2

神秘的藥物或粉末

破解

朋友推薦效果好，但來路不明的“好東西”或桌上有不明白色粉末，可能是毒品，請堅定拒絕。

線索3

外表討喜的糖果、糖片、巧克力

破解

毒品有可能被製成討喜的零食，引誘大家食用。

線索4

開封的飲料或調酒

破解

G水、FM2等大多為無色、無味液體或白色粉末，容易被加入飲料或調酒中，請勿隨意接收別人請的飲料，更別讓已開封的飲料離開視線。

線索5

咖啡!茶包!奶茶包!真假分不清?

破解

毒品偽裝方式千奇百怪，最常見偽裝為咖啡包、茶包或奶茶包，讓人無法辨識，請留意封口是否有重複包裝的痕跡，如有異狀，切莫使用。

常見濫用物質

搖頭丸、忘我、亞當、狂喜(MDMA)

濫用危害

體溫過高(可達到43°C)、盜汗、運動過度、妄想、眼球快速轉動、視力模糊，與酒精併用易加速脫水、橫紋肌溶解(出現可樂般顏色尿液)、急性腎衰竭等。



愷他命、K他命、K仔(Ketamine)

濫用危害

心悸過速、血壓上升、噁心、嘔吐、流淚、複視(雙重影像)、視力模糊、影像扭曲、頭暈、無法行走、長期使用會造成膀胱受損、頻尿、尿少、下腹部疼痛等。



液態搖頭丸、G水(GHB)

濫用危害

噁心、嘔吐、呼吸困難、頭痛、失去意識、昏迷及死亡，與酒精併用會加劇其危險性。



喵喵、Meow、m-Cat(Mephedrone)

濫用危害

嚴重血管收縮、血壓上升、心悸、心律不整、焦慮、幻覺、妄想、痙攣等。



大麻、老鼠尾、麻仔、飯(Marijuana)

濫用危害

心跳加速、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用會造成記憶、學習及認知能力減退、體重增加、免疫力降低、不孕症。



笑氣、吹氣球(N₂O)

濫用危害

幻覺、失憶、暈眩、手指或腳趾(末梢)麻痺、耳鳴、臉潮紅、臉部刺痛感。



Kamufase Narkoba Menghancurkan Semuanya

Saat Anda merasa

1. Pusing, mual atau muntah
2. Pandangan kabur atau distorsi gambar
3. Tubuh lemas atau tidak bertenaga
4. Perilaku aktif berlebihan yang tidak terkendali
5. Kecemasan tanpa sebab
6. Delusi, halusinasi

Cara Penanganan

- ★ Tinggalkan tempat kejadian segera
- ★ Mintalah bantuan pada orang yang dapat dipercaya
- ★ Laporkan polisi

Petunjuk 1

Balon Berwarna

Cara Penanggulangan

Jangan remehkan balon berwarna tersebut, ada kemungkinan terisi Oksida Nitrat (N₂O), yang menyebabkan halusinasi, hilang ingatan atau pusing, dan tinggalkan tempat kejadian segera.

Petunjuk 2

Obat atau Bubuk Misterius

Cara Penanggulangan

Mendapat rekomendasi dari teman bahwa hasilnya baik, namun "barang baik" yang tidak jelas asal usulnya atau bubuk putih yang tak dikenal diatas meja, mungkin sekali adalah narkoba, tolaklah dengan serius.

Petunjuk 3

Berbentuk permen, manisan, coklat yang menarik.

Cara Penanggulangan

Narkoba dapat dibuat dalam bentuk snack yang menarik yang memiliki daya tarik agar setiap orang memakannya.

Petunjuk 4

Minuman atau Koktail yang telah terbuka

Cara Penanggulangan

Cairan G, FM2, dan sejenisnya merupakan cairan yang tidak berwarna dan tidak berbau atau berbentuk bubuk putih, yang dapat ditambahkan ke dalam minuman atau koktail dengan mudah. Jangan sembarangan menerima minuman dari orang lain, dan jangan biarkan minuman yang sudah dibuka dibiarkan tanpa diawasi.

Petunjuk 5

Kopi, Teh Teh Susul Tidak dapat membedakan mana yang asli atau palsu?

Cara Penanggulangan

Ada berbagai cara kamufase narkoba, biasanya disamarkan sebagai sachet kopi bubuk, teh atau teh susu sehingga tidak dapat dikenali. Perhatikan apakah ada tanda-tanda pernah dibuka, bila ada tanda tidak normal, jangan digunakan.

Narkoba Yang Sering Ditemui

Ekstasi, Fantasy Pills, Adam, MDMA

Bahaya Hipertermia (sampai 43°C), keringat malam, olahraga berlebihan, delusi, Rapid Eye Movement, penglihatan kabur, bila dikonsumsi dengan alkohol akan mempercepat dehidrasi, rhabdomyolysis kerusakan otot berbahaya (muncul urin berwarna seperti coca cola), gagal ginjal akut.



Ketamine, Happy K, Special K

Bahaya Denyut nadi makin cepat, tekanan darah meningkat, mual, muntah, keluar air mata, diplopia (penglihatan ganda), penglihatan kabur, distorsi gambar, pusing, tidak dapat berjalan, penggunaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kandung kemih, sering buang air kecil, urin sedikit, perut bagian bawah nyeri, dll.



Ekstasi Cair, Cairan G (GHB)

Bahaya Mual, muntah, sulit bernafas, sakit kepala, kehilangan kesadaran, koma dan kematian, dan bila dikonsumsi dengan alkohol akan meningkatkan bahaya.



Meow Meow, M-Cat (Mephedrone)

Bahaya Penyempitan saluran darah, tekanan darah meningkat, jantung berdebar-debar, aritmia (denyut jantung tidak menentu), kecemasan, halusinasi, delusi, kejang, dll.



Ganja, Ekor Tikus, Ma Tsai, Beras (Marijuana)

Bahaya Detak jantung meningkat, delusi, halusinasi, mulut kering, mata merah dan fenomena lainnya, penggunaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan daya ingatan menurun, kemampuan belajar dan pengenalan melemah, berat badan meningkat, kekebalan berkurang, infertilitas.



Oksida nitrat, blower (N₂O)

Bahaya Halusinasi, amnesia (lupa ingatan), pusing, kelumpuhan jari tangan atau kaki (peripheral), tinnitus, muka merah, rasa tusukan di kepala dan wajah, dll.



Waikato Tainui Huiang Wei-shi
Siro Ketenagakerjaan Kota Tainui Wang Hsin-chi
Peduli dengan kesehatan anda

Hotline Bebas Pulsa 0800-770-885



Reveal Narcotics in Disguise

When You

1. feel dizzy, nauseous, or are vomiting
2. have blurred vision or image distortion
3. feel limp or weak
4. are uncontrollably hyperactive
5. feel inexplicably anxious
6. have delusions and hallucinations

Ways to Deal With it

- ★ Leave the place as soon as possible
- ★ Ask for help from someone reliable
- ★ Call the police

Clue 1

Colorful inflatable balloons

Solution

Be careful about these inflatable balloons, which are filled with N2O may cause hallucinations, amnesia or dizziness. Please leave the place as soon as possible.

Young people visit night clubs frequently, where hidden dangers exist. Important clues and solutions to reveal narcotics in disguise are provided below:

Clue 2

Mysterious drugs or powder

Solution

Regardless of friends' recommendations, do not try any unknown "good stuff" or white powder. These might be narcotics.

Clue 3

Adorable candy, candy pieces, and chocolate

Solution

GHB and FM2 are colorless, odorless liquids or white powders, which are easily added into drinks or cocktails. Never accept drinks opened by strangers, and never let your drinks out of your sight.

Clue 4

Unsealed drinks or cocktails

Solution

GHB and FM2 are colorless, odorless liquids or white powders, which are easily added into drinks or cocktails. Never accept drinks opened by strangers, and never let your drinks out of your sight.

Solution

Drugs are disguised in various ways. Common disguises are coffee bags, tea bags, or milk tea bags, which people cannot identify easily. Be on the lookout for re-packaging. Never use things that may have been tampered with.

Clue 5

Coffee! Tea bag! Milk tea bag! Which one is real?

Commonly Abused Substance

XTC, Bomb, Adam, Ecstasy (MDMA)

Hazards caused by abuse Hyperthermia (up to 43°C), night sweats, hyperactivity, delusions, rapid eye movement, blurred vision. Taking it with alcohol will accelerate dehydration, rhabdomyolysis (appearing as cola-colored urine), and acute renal failure.



Ketamine, Special K, Super K

Hazards caused by abuse Tachycardia, increased blood pressure, nausea, vomiting, tearing, diplopia (double visions), blurred vision, image distortion, dizziness, unable to walk. Long-term use can cause damage to the bladder, frequent urination, scanty urine, and lower abdominal pain.



Liquid Ecstasy, Georgia Home Boy (GHB)

Hazards caused by abuse Nausea, vomiting, shortness of breath, headache, loss of consciousness, coma and death. Taking it with alcohol will exacerbate the hazards



Meow-Meow, Meow, M-cat (Mephedrone)

Hazards caused by abuse severe vasoconstriction, increased blood pressure, heart palpitations, arrhythmia, anxiety, hallucinations, delusions, and spasms.



Marijuana, Grass Ganja, Pot

Hazards caused by abuse Accelerated heartbeat, delusions, hallucinations, dry mouth, eye redness. Long term use can cause memory, learning ability and cognition to decline. It can also cause weight gain, reduced immunity, and infertility.



Laughing Gas, N2O

Hazards caused by abuse Hallucinations, amnesia, dizziness, paralysis in fingers or toes (peripheral), tinnitus, flushing, and tingling in the hand and face.





ถอดรหัสยาเสพติดปลอมหมดเปลือก

เมื่อคุณรู้สึก

1. เวียนศีรษะ คลื่นไส้หรืออาเจียน
2. สายตาพร่ามัวหรือมองเห็นภาพที่บิดเบี้ยว
3. ร่างกายอ่อนแอหรือไม่มีแรง
4. ตื่นตัวมากเกินไปจนไม่สามารถควบคุมได้
5. วิตกกังวลอย่างไม่มีสาเหตุ
6. มีอาการหลงผิดทางจิต ประสาทหลอน

วิธีการจัดการ

- ★ รีบฉวยโอกาส หลบออกสถานที่นั้นโดยเร็ว
- ★ ขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้ใจได้
- ★ แจ้งความกับตำรวจ

เบาะแส 1

ลูกโป่งสีต่างๆ

ถอดรหัสรูปแบบ

อย่าเพิ่งมองข้ามลูกโป่งที่ใช้ตกแต่งสถานที่เหล่านี้ ภายในอาจบรรจุ "ก๊าซหัวเราะ (N2O)" ที่ทำให้เกิดอาการประสาทหลอนความจำเสื่อมหรือมีอาการวิงเวียนศีรษะจนเกือบหมดสติได้



ผับ-บาร์เป็นสถานที่ที่คนหนุ่มสาวมักเข้า-ออก เป็นประจำ แต่ก็มักแอบซ่อนอันตรายเอาไว้ได้ง่ายขอแนะนำเบาะแสของยาเสพติดที่อาจแอบแฝงมาและวิธีการแยกแยะที่สำคัญดังนี้

เบาะแส 2

ยาหรือผงยาสีกลับ

ถอดรหัสรูปแบบ

เพื่อนแนะนำว่าใช้ได้ผลดี แต่เป็น "ของดี" ที่มีที่มาไม่ชัดเจน หรือผงสีขาวบนโต๊ะที่ไม่ทราบว่าเป็นของอะไรซึ่งอาจเป็นสารเสพติด จะต้องปฏิกิริยาอย่างเด็ดขาด

เบาะแส 3

ลูกกวาด เมื่อลมพัดโกเลตต์ที่มีกลิ่นหรือสีน่ารับประทาน

ถอดรหัสรูปแบบ

ยาเสพติดอาจถูกทำขึ้นในรูปแบบของขนมที่มีน้ำตาลรับประทานเหมือนลูกกวาดให้คนอื่นรับประทาน

เบาะแส 4

เครื่องดื่มหรือเหล้าคือแอลกอฮอล์

ถอดรหัสรูปแบบ

ยาจีเอสเอ็ม ยา FM2 ส่วนใหญ่เป็นของเหลวที่ไม่มีกลิ่นหรือเป็นผงสีขาวที่ใช้ผสมลงในเครื่องดื่มหรือเหล้าคือแอลกอฮอล์ได้ง่ายจึงไม่ควรรับเครื่องดื่มจากคนอื่น สังเกตและยังไม่ควรให้เครื่องดื่มแล้วอยู่ห่างจากสายตาดู

เบาะแส 5

กาแฟชาของ! ของจริงหรือของปลอมแยกไม่ออก

ถอดรหัสรูปแบบ

ยาเสพติดแอบแฝงมาในรูปแบบต่างๆ มากมายที่พบได้บ่อยมักแอบแฝงมาในรูปแบบของซองกาแฟซองชาหรือซองชาแบบ ทำให้ไม่สามารถแยกแยะได้ จึงควรสังเกตบริเวณปากถุงว่ามีกริดฉนวนที่ขุ่นหรือไม่หรือหากมีสีและที่ผิดปกติก็ไม่ควรดื่มเด็ดขาด

ยาเสพติดที่พบบ่อย

ยาอี ยาเลิฟ เอ็มซีตาซี(MDMA)

อันตรายจากการเสพยา อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น(อาจสูงถึง43°C)เหงื่อออกมาก มีการเคลื่อนไหวมากเกินไปมีอาการหลอนทางจิต ลูกตากลอกไปมาอย่างรวดเร็ว สายตาพร่ามัว หากใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายขับน้ำเร็วขึ้น กล้ามเนื้อกระตุกตัว (ปัสสาวะมีสีคล้ายสีคล้ายสีน้ำโคล่า)มีอาการไตวายเฉียบพลันเป็นต้น



ยาเค เคตามิน(Ketamine)

อันตรายจากการเสพยา หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ความดันเลือดสูงขึ้น คลื่นไส้ อาเจียน น้ำตาไหล เห็นภาพซ้อน(เห็นภาพสองซ้อนกัน)สายตาพร่ามัวเห็นภาพที่บิดเบี้ยว เวียนศีรษะ ไม่มีแรงเดินหากเสพเป็นเวลานาน จะทำให้กระเพาะปัสสาวะได้รับความเสียหาย ปัสสาวะบ่อยปวดบริเวณท้องน้อยเป็นต้น



จีเอสบี(GHB)

อันตรายจากการเสพยา คลื่นไส้ อาเจียน หายใจลำบาก ปวดศีรษะ นมดลดี สลิมสลือและอาจเสียชีวิต หากใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีอันตรายรุนแรงมากขึ้น



เมฟโดรอน(Mephedrone) เอ็ม-แคท

อันตรายจากการเสพยา หลอดเลือดหดตัวอย่างรุนแรง ความดันเลือดสูงขึ้น ใจสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ วิตกกังวล ประสาทหลอน มีอาการหลอนทางจิต กล้ามเนื้อกระตุกเป็นต้น



กัญชา(Marijuana)

อันตรายจากการเสพยา อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น มีอาการหลอนทางจิต ประสาทหลอน ปากแห้ง ตงตาแดงกำเป็นต้น หากเสพเป็นเวลานานจะทำให้ความสามารถในการเรียนรู้และการรับรู้ลดลง นำหนักตัวเพิ่มขึ้น ภูมิคุ้มกันลดลง มีบุตรยาก



ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ก๊าซหัวเราะ

อันตรายจากการเสพยา ประสาทหลอน ความจำเสื่อม วิงเวียน(ปลาย)นิ้วมือ และนิ้วเท้ามีอาการเหน็บชาหรืออ่อนแรง ปวดศีรษะบริเวณศีรษะและใบหน้า





Ma túy nguy hại Toàn dân khám phá

Khi bạn cảm thấy

1. Chóng mặt, buồn nôn và nôn mửa
2. Mắt mờ hoặc biến dạng hình ảnh
3. Toàn thân mèn mẩn hoặc không có sức
4. Hoạt động quá độ không thể kiểm chế
5. Lo lắng không có lý do
6. Ảo tưởng, ảo giác

Phương thức sử lý

- ★ Nắm bắt thời gian, nhanh chóng rời khỏi hiện trường
- ★ Xin cứu giúp từ người đáng tin cậy
- ★ Báo cảnh sát

Manh mối 1

Bong bóng bơm màu

Khám phá :

Tuyệt đối không nên xem nhẹ những chất bong bóng này, bên trong có thể chứa chất khí cười (N₂O), xuất hiện ảo giác, mất trí hoặc cảm giác chóng mặt, hãy nhanh chóng rời khỏi hiện trường.



Câu lạc bộ đêm là nơi mà thanh niên thường lui tới, nhưng để ẩn chứa nguy cơ, cung cấp manh mối khả nghi nguy hại ma túy quan trọng và phương pháp giải quyết.

Manh mối 2

Dược phẩm hoặc loại bột thần bí

Khám phá :

Bạn bè giới thiệu hiệu quả tốt, nhưng nguồn gốc rõ ràng hoặc bột màu trắng không rõ trên bàn có thể là ma túy, xin hãy kiên quyết từ chối.

Manh mối 3

Kẹo, Đường viên, số cô la có bề ngoài bất mắt

Khám phá :

Ma túy có thể được sản xuất thành đồ ăn vặt yêu thích, dụ dỗ mọi người sử dụng

Manh mối 4

Đồ uống bột nắp hoặc rượu pha chế

Khám phá :

Nước G, FM2... đa số là chất lỏng không màu, không vị hoặc bột màu trắng, dễ bị cho vào trong đồ uống hoặc rượu pha chế, tuyệt đối không tùy tiện dùng đồ uống người khác mời, không nên để đồ uống bột nắp cách xa tầm nhìn.

Manh mối 5

Cà phê | Túi trà | hoặc túi trà sữa !
Thật khó mà nhận biết?

Khám phá :

Cô vô văn phương thức nguy hại ma túy, nguy hại thường thấy là túi cà phê, túi trà hoặc túi trà sữa, khiến mọi người không thể nhận biết, hãy lưu ý miệng túi có tích đồng gói lại hay không, nếu có hiện tượng bất thường, tuyệt đối không sử dụng.

chất lạm dụng thường gặp

thuốc lắc ,Ecstasy,Adam ,Thuốc gây hưng phấn(MDMA)

Tác hại của việc lạm dụng: Nhiệt độ cơ thể quá cao (có thể cao tới 43°C), mồ hôi trộm, vận động quá độ, hoang tưởng, nhân cầu chuyển động nhanh, mắt mờ, nếu dùng cùng với rượu gây mất nước nhanh, tiểu cơ vắn (xuất hiện nước tiểu giống như màu coca) suy thận cấp tính.



Ketamin, tamin K ,hạ T K (Ketamin)

Tác hại của việc lạm dụng: Mạch tim quá nhanh, tăng huyết áp, buồn nôn, nôn mửa, chảy nước mắt, nhìn đôi (hai hình ảnh), mắt mờ, hình ảnh biến dạng, chóng mặt, không thể đi lại, sử dụng lâu dài gây tổn thương bàng quang, đi tiểu nhiều lần, tiểu ít, đau phía bụng dưới...



Thuốc lắc dạng nước, nước G (GHB)

Tác hại của việc lạm dụng: Buồn nôn, nôn mửa, khó thở, đau đầu, mất ý thức, hôn mê và tử vong, dùng cùng với rượu tăng thêm tác hại của dược phẩm.



Meo meo, Meow, m-cat (mephedrone)

Tác hại của việc lạm dụng: Co mạch máu nghiêm trọng, tăng huyết áp, đánh trống ngực, rối loạn nhịp tim, lo lắng, ảo giác, hoang tưởng, co thắt...



Cần sa, đuôi chuột ,ma tử com (Marijuana)

Tác hại của việc lạm dụng: Hiện tượng như: tim đập nhanh, hoang tưởng, ảo giác, khô miệng, mất đồ, thời gian dài sử dụng gây ra suy giảm trí nhớ, khả năng học tập và khả năng nhận thức, tăng trọng lượng cơ thể, giảm khả năng miễn dịch, bệnh vô sinh.



Bong cười ' thổi bong bóng (N₂O)

Tác hại của việc lạm dụng: Ảo giác, mất trí nhớ, chóng mặt, ngón tay hoặc chân (ngoi vi) tê liệt, ú tai, mất đồ, cảm giác đau nhức ở đầu và mắt.

